Pescatore n°10

Vass7R05s341-345

Wtb877

OMtp877

OMtp877

Oollection Vassal-Montpellier

Pescatore Nº10 7 R5 x 341.345















ANNEE 1989 NOM Pescatore ne 20 N EMPLACEMENT 7 135 5 341.345

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité					raison mi/v		Maturité	
3 &			293 × 273 · 273 ·		5,0	30,5	56 +2	12,6	<b>3</b> ,8	2,8 +3	21,8	18.9	
Pourriture: 0 Mill.: 5% Port: enige'  1 & 27.3.88 +9									7	Vigueur : 3			

ANNEE 1990 NOM Pescatore Nº 10 N EMPLACEMENT 7 R50.341,345 ...

Nuc.												
Souche	Nore yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
3 4	2 3	8-5	19.3. 15.3. 12.3. 19.3. 15.3.	1 2		23.5	25,5	28.5	6.8	13.8 +5		26 9.90
Pourriture: O Mill.: O Port · Paine Vigueur · Z										2		

NOM Pescalore Nº 10

NOM Percatore Nº 10 EMPLACEMENT 7 Rg 5 s 341, 345

Souche Nore Débourrement Noire Ferti- Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 6 24.3 26.3 3 6 7.6 11.6 17.6 19.8 25.8 29.8 16.9 2 4 15.3 26.3 3 6 24.4 14 14 14 15 25.8 29.8 16.9 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 2.4 29.3 20.3 2 20

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Percatore nº 10 7R5 1,341.345 (0,1)

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité

laineuse 279.

Blanc 1916 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 1916 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzée ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 238.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvoss

N° d'ordre :

Sescatore nº 40 7R5D-341-345(6.1) Désignation : Emplacement :

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Reseatore n°= 10 7R5s-341.345 (6,5)

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159) - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

£ alvo 88

N° d'ordre : Rescatore m² 10

Désignation : 7 R5 3341.345 (5,4)

Emplacement :

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 49 x48). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97)- ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11]. A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière (27). A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo88

Rescatore nº 10 7 R50-341-345.A.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames ((2)). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

-Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation : Pescatore N°10
Emplacement : 7 R5 s 341.345

Angle des nervures

: 1 - 2 - (3) : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - (8) - 9 L1/L2 : (10)- 11 L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - (47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 20